
Dušan Ilić¹, Sanja Ognjanović, Bojana Popović, Valentina Elezović Kovačević, Milica Opalić Palibrk, Lena Radić, Katarina Krstić, Đuro Macut

MEDULARNI KARCINOM ŠTITASTE ŽLEZDE SA ACTH ZAVISNIM KUŠINGOVIM SINDROMOM, TERAPIJSKE MOGUĆNOSTI

Prikaz slučaja

Pacijentkinji staroj 61 godinu je avgusta 2016. godine, učinjena totalna tiroidektomija sa centralnom i funkcionalnom levostranom disekcijom vrata zbog polinodozne strume i povišenih baznih vrednosti kalcitonina (37.2 pg/mL). Patohistološki i imunohistohemijski je verifikovan medularni karcinom štitaste žlezde veličine 30 mm sa diseminacijom u regionalne limfne čvorove (T3N1b(3/5)Mx). Postoperativno zaostaje pareza leve polovine larinxa uz jatrogeni hipoparatiroidizam. Uvedena je supstituciona terapija l-tiroksinom, kalcitriolom i kalcijumom. Postoperativnim MSCT pregledom vrata i grudnog koša oktobra 2016. godine i maja 2017. godine verifikuje se progresija bolesti, u loži štitaste žlezde je opisan rest/recidiv tumora, levostrana parafaringealna i supraklavikularna limfadenopatiju uz mikronodularne promene u parenhimu oba plućna krila i porast koncentracije kalcitonina (752.4 pg/mL). Scintigrafijom somatostatinskih receptora je verifikovano vezivanje radiofarmaka u loži štitaste žlezde i medijastinumu (gradus II-III), dok je DMSA scintigrafija bila pozitivna u loži štitaste žlezde levo i levom plućnom krilu. Maja 2017. godine je učinjena redisekcija leve polovine vrata a patohistološki su potvrđene metastaze medularnog karcinoma štitaste žlezde. Predložena je lokalna zračna terapija koja nije sprovedena s obzirom na postojanje udaljene diseminacije bolesti. Dva meseca nakon redisekcije vrata učinjen je ¹⁸FDG-PET/CT kojim se potvrđuje rest/recidiv tumora u loži štitaste žlezde uz depozite jugularno i paratrahealno levo, obostrano u oba plućna krila i jetri. MR endokranijuma je bio urednog nalaza, uključujući i selarnu regiju, dok se parafaringealno levo verifikuje sekundarni depozit. Oktobra 2017. godine zbog pogoršanja opšteg stanja pacijentkinja je hospitalizovana. Na prijemu odaje

¹ Dušan Ilić, Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, UKCS.

utisak srednje teškog bolesnika, PS 2, normalno uhranjena, eumetabolična, urednih telesnih proporcija. Zbog mišićne slabosti i svakodnevnih jakih glavobolja zauzima antalgičan položaj u postelji, u terapiji opijatni analgetici i SSRI. Krvni pritisak je bio dobro kontrolisan antihipertenzivnom terapijom. U rutinskim biohemijskim analizama verifikovana hipoklemija (K 3.2 mmol/L) sa hiperkalurijom uz metaboličku alkalozu. Nije bilo poremećaja glikoregulacije, uredan lipidogram. Kalcitonin je bio povišen (346.8 pg/mL) kao i CgA (487.6 ng/mL) uz uredne koncentracije CEA. Potvrđen je poremećen dnevni ritam sekrecije kortizola (8h 1013.6 nmol/L, 24h 620.7 nmol/L) uz izostanak supresije tokom supresionih testova deksametazonom (DEXI 435.4 nmol/L, DEXII 729.4 nmol/L). Iz tehničkih razloga vrednosti ACTH nisu bile dostupne. Zbog nedostatka kalupa primarno operisanog tumora štitaste žlezde učinjeno je dopunsko imunohistohemijsko bojenje na ACTH ekstirpiranih limfnih žlezda dobijenih nakon druge operacije. Bojenje je bilo negativno. Direktnim sekvenciranjem nije nađena germinativna mutacija u *RET* protoonkogenu. Na kontrolnom MSCT pregledu vrata, grudnog koša i abdomena se verifikuje dalja progresija bolesti, uz uvećanje svih prethodno uočenih promena, nove promene u glavi pankreasa i nodularne promene u levoj nadbubrežnoj žlezdi karakteristika adenoma. Isključen je kateholaminski eksces. U cilju kontrole hiperkortizolemije u terapiju je uveden metirapon a zbog brzine progresije osnovne bolesti uveden je vandetanib. Ubrzo po uvođenju terapije dolazi do dramatičnog subjektivnog i objektivnog poboljšanja zdravstvenog stanja pacijentkinje, iz terapije je isključena antidolorozna terapije. Nakon tri meseca terapije na kontrolnom MSCT-u se verifikuje parcijalna remisija svih prethodno opisanih promena u vratu, plućima, jetri i glavi pankreasa. Korigovane su hiperkortizolemija i hipokalemija. Pacijentkinja se subjektivno dobro osećala do februara 2018. godine kada se javlja epileptični napad praćen poremećajem svesti i retrogradnom amnezijom u trajanju od pet dana. MR pregledom endokranijuma nisu videne fokalne promene a zbog sumnje na pojavu sindroma reverzibilne posteriorne leukoencefalopatije dalja primena vandetaniba je privremeno obustavljena. U međuvremenu su dobijene vrednosti ACTH 60.7 ng/L koje su ukazivale na ACTH zavisni Kušingov sindrom. Planiran je kontrolni pregled radi odluke o daljem toku lečenja, ali se pacijentkinja nije javila.

Diskusija

Medluarni karcinom štitaste žlezde (MTC) je redak neuroendokrini tumor koji nastaje od parafolikularnih C ćelija, i čini 1-2% svih karcinoma štitaste žlezde (1). U 75-80% slučajeva se javlja kao sporadični tumor dok je u preostalih 20-25% autozomno dominantna nasledna bolest i javlja se u sklopu dva klinička sindroma, multiple endokrine neoplazije tip 2A (MEN 2A) i tip 2B (MEN2B) (1). Skoro sve osobe sa ovim hereditarnim sindromima imaju germinativnu mutaciju *RET* proto-

onkogena dok se u gotovo dve trećine sporadičnih MTC javlja somatska mutacija, najčešće u 918 kodonu (M918T) (2). Nađeno je da u 10-70% sporadičnih MTC koji nemaju somatsku mutaciju u *RET* protoonkogenu postoji somatska mutaciju u *HRAS*, *KRAS* ili nešto rede u *NRAS* genima (2). Sporadični MTC najčešće nastaje u četvrtoj ili šestoj deceniji života (1). Za razliku od naslednog MTC-a koji je uglavnom multicentričan i bilateralan, sporadični MTC se uglavnom javlja kao solitarni unilatearni tumor štitaste žlezde (1). Kod oko 70% pacijenta sa palpabilnim čvorom u štitastoj žlezdi postoje metastaze u regionalnim limfnim žlezdama vrata dok 10% pacijenta ima i udaljene metastaze (1). MTC najčešće metastazira u mediastinalne limfne žlezde, pluća, jetru, kosti, a nešto rede kožu i mozak (1). Desetogodišnje preživljavanje pacijenata u stadijumu I, II, III i IV iznosi 100%, 93%, 71% i 21%, respektivno (1).

C-ćelije štitaste žlezde sekretuju nekoliko hormona ili biogenih amina. Najznačajniji su kalcitonin i karcinoembrionalni antigen (CEA), a njihova koncentracija je u direktnoj srazmeri sa masom C-ćelija i koriste se kao markeri tumorske progresije(3). Pored njih C-ćelije mogu sekretivati i adrenokortikotropni hormon (ACTH), kortikotropin oslobađajući hormon (CRH), B-melanocit stimulišući hormon, hromogranin, histamin, neurotensin i somatostatin(3).

Kao posledica ektopične sekrecije ACTH ili CRH može nastati Kušingov sindrom. MTC je odgovoran za nastanak 2.2-7.5% svih slučajeva ektopičnog Kušingovog sindroma, dok oko 0.7% pacijenata sa MTC-om ima ektopični Kušingov sindrom (4). Do sada je u literaturi opisano oko 50 slučajeva ektopičnog Kušingovog sindroma kod pacijenata sa MTC-om (4). Negativno imunohistohemijsko bojenje na ACTH uprkos dokazima o tumorskoj produkciji može biti posledica smanjene količine deponovanog ACTH u celijama tumora usled njegove obilne sekrecije (5). Drugi razlog može biti poremećaj u translaciji i obradi pro-opiomelanokortinske (POMC) mRNK, kao i tumorska sekrecija CRH (5). Takođe profil sekretovanih hormona se može razlikovati između primarnog tumora i metastaza kod istog pacijenta (5). Pojava Kušingovog sindroma kod pacijenta sa uznapredovalim MTC-om ima loš prognostički znak i povezana je sa kratkim periodom preživljavanja (6). Kontrola hiperkortizolemije i pridruženih kliničkih manifestacija se može postići uklanjanjem ili redukcijom metastaza, primenom ketokonazola, mifepristona, metiraponi ili mitotana, ili bilateralnom adrenalektomijom (6). Postoje podaci o povlačenju simptoma i znakova Kušingovog sindroma nakon primene vandetaniba (7). Kod naše pacijentkinje je verifikovan poremećen dnevni ritam sekrecije kortizola uz odsustvo supresije tokom supresionih testova deksametazonom. Iz tehničkih razloga vrednosti ACTH nisu bile odmah dostupne a obzirom na teško opšte stanje pacijentkinje u terapiju je uveden metirapon uz postizanje povoljnog terapijskog odgovora. Kasnije dobijene vrednosti ACTH potvrđuju postojanje ACTH zavisnog Kušingovog sindroma, verovatno ektopičnog, ali se sa sigurnošću ne može isključiti ni mogućnost postojanja Kušingove bolesti što bi u tom slučaju otvorilo pitanje

postojanja multitumorskog sindroma. U prilog ektopične sekrecije ACTH govori hipokalemijska metabolička alkaloza koja je češća nego u Kušingovoj bolesti (57% vs 10%). Iako se u ektopičnom Kušingovom sindromu očekuju više vrednosti ACTH moguć je i izvestan stepen preklapanja u odnosu na vrednosti koje se češće viđaju u Kušingovoj bolesti. Na MR pregledu endokranijuma u dva navrata selarna regija je opisana kao uredna a iz tehničkih razloga nije urađen ciljani MR pregled hipofize kao ni semplovanje petroznih sinusa.

Totalna tiroidektomija sa disekcijom limfnih čvorova vrata je standardni vid lečenja pacijenata sa sporadičnim ili naslednjim MTC-om (1). U slučaju značajne regionalne ili metastatske bolesti svrsishodnije su manje agresivne hirurške tehnike kako bi se sačuvalo govor, akt gutanja, funkcija paraštitastih žlezda i pokretljivost ramena (1). U cilju dodatne kontrole bolesti može se razmotriti primena lokalne zračne terapije (RT) (8). Primena lokalne RT ima za cilj postizanje lokalne kontrole bolesti kod pacijenata sa visokim rizikom od regionalnog recidiva. Lokalnu RT je najbolje sprovedi kod pacijenta koji više nisu kandidati za hirurško lečenje obzirom da postiradiacione sekvele otežavaju hiruršku intervenciju i povećavaju mogućnost pojave značajnih komplikacija (8). Neophodno je sprovođenje dodatnih prospективnih studija u cilju procene koristi adjuvantne RT i njenog uticaja na ukupno preživljavanje pacijenata sa MTC-om.

Većina pacijenata sa udaljenim metastazama ima indolentnu bolest i ne zahtevaju sistemsku terapiju dugi niz godina.

Obzirom da je metastatski MTC neizlečiva bolest lečenje ima za cilj postizanje loko-regionalne kontrole bolesti, simptomatskog lečenja sindroma koji su posledica hormonske hipersekrecije (kao što su dijareja ili Kušingov sindrom), palijativnog simptomatskog lečenja tegoba koje nastaju kao posledica udaljenih metastaza (bol ili patološki prelomi kostiju) ili kontrola metastaza koje ugrožavaju život (opstrukcija disajnih puteva ili kompresija kičmene moždine). Većina pacijenata sa povišenim koncentracijama kalcitonina i okultnom metastatskom bolešću, a koji nemaju simptome, nisu kandidati za sistemsku terapiju obzirom da većina njih ima relativno dobru prognozu, naročito ako je vreme udvostručavanja koncentracije kalcitonina i CEA duže od dve godine.

Sistemska hemoterapija se može primeniti kod pojedinih pacijenata ali je terapijski odgovor na citotksične agense relativno loš i kratkog trajanja te se stoga ne preporučuje kao prva terapijska linija (8, 9). Takođe, ovi tumori su radiorezistentni(9).

Iskustva sa primenom radionuklidne terapije su ograničena. Pojedine studije sprovedene kod pacijenata sa uznapredovalim MTC-om i tumorskom pozitivnošću na ¹¹¹In-octreoscan-u i visokom ekspresijom somatostatinskih receptora na imuno-histohemijskom bojenju su pokazale povoljne efekte na preživljavanje i dugoročnu bezbednost sistemske primene ⁹⁰Y-DOTA-TOC (10).

Multikinazni inhibitori su sistemska agensi koji pre svega utiču na proces angiogeneze, inhibišući rast tumorskih ćelija, ćelija koje okružuju tumorske ćelije ali i

zdravog endotela. Vandetanib i kabozantinib su u kliničkim studijama kod značajnog broja pacijenata doveli do parcijalne remisije i stabilizacije bolesti tokom dužeg vremenskog perioda i značajno produžili period preživljavanja bez progresije bolesti, ali bez jasnih dokaza za produženje ukupnog preživljavanja (11, 12). Nažalost ovi lekovi imaju značajne neželjene efekte te je često potrebno redukovati dozu ili ih u potpunosti obustaviti. Najčešći neželjeni efekti tokom primene vandetaniba su dijareja, akne, umor, mučnina, hipertenzija, glavobolja, povraćanje, fotosenzitivnost i produženje QT intervala. Najčešće laboratorijske abnormalnosti su hipokalcemija, porast transaminaza, hipoglikemija, hipotiroidizam i porast koncentracije kreatinina. Retki ali ozbiljni neželjeni efekti su Stiven Džonsonov sindrom, intersticijalni pneumonitis, ishemijski moždani udar, srčana insuficijencija i sindrom reverzibilne posteriorne leukoencefalopatije koji je praćen epileptičnim napadima, glavoboljom, poremećajima vida, konfuznošću ili poremećajem stanja svesti. U slučaju pojave neželjenih efekta gradusa 3 ili 4 savetuje se redukcija doze leka. Pre započinjanja terapije neophodna je korekcija elektrolitnog disbalansa kao što su hipokalcemija, hipokalemija i hipomagnezijemija uz redovne kontrole EKG-a pre, 2 do 4 nedelje i 8 do 12 nedelja nakon započinjanja lečenja a zatim svaka 3 meseca. Pre uvođenja bilo kog drugog leka neophodna je konsultacija sa lekarom obzirom na opasnost od nastanka produženja QT intervala i pojave malignih aritmija. Najčešći neželjeni efekti kabozantiniba su dijareja, stomatitis, *hand-foot* sindrom, gubitak u telesnoj težini, mučnina, poremećaj ukusa. Takođe se može javiti porast transaminaza, hipokalcemija, hipokalemija, porast TSH, neutropenija i trombocitopenije. Zabeleženi su slučajevi pojave perforacija i fistula gastrointestinalnog trakta kao i krvarenja. Izbor TKI, osim dostupnosti, zavisi i od pridruženih bolesti pacijenta. Obzirom da vandetanib može dovesti do produženja QT intervala ne treba ga davati pacijentima sa sindromom produženog QT, aritmijama, dekompenzovanom srčanom insuficijencijom ili nekorigovanim elektrolitnim disbalansom. Ne treba ga давати pacijentima čiji je korigovani QT (QTc) interval duži od 450 ms. Kabozantinib ne treba давати pacijentima sa hroničnim bolestima gastrointestinalnog trakta (Kronova bolest i ulcerozni kolitis), aktivnim peptičkim ulkusom, divertikulitisom, hemoptizijama ili krvarenjem, kao ni pacijentima nakon RT vrata i medijastinuma zbog povećanog rizika od nastanka gastrointestinalnih perforacija, traheoezofagealnih fistula i krvarenja. Kod većine pacijenata se vremenom razvija rezistencija na TKI sa posledičnom progresijom bolesti.

Poslednjih godina su razvijeni i odobreni kinazni inhibitori visoko specifični za RET, kakvi su selperatinib i pralsetinib, sa povoljnim tumorskim odgovorom ako se primene kao prva i druga terapijska linija, ali su neophodne dodatne studije, koje su u toku, a radi procene efekta na preživljavanje.(13, 14)

Zaključak

Ektopični Kušingov sindrom je retka komplikacija medularnog karcinoma štitaste žlezde i predstavlja značajan dijagnostički i terapijski izazov. Često nedostaju klasični klinički znaci ni simptomi Kušingovog sindroma zbog njegovog brzog nastanka u kontekstu metastatske maligne bolesti. Međutim pojava teške hipokalemije, naglo nastala mišićna slabost, kao i poremećaj glikoregulacije kod pacijenata sa metastatskim medularnim karcinomom bi trebali da pobudi sumnju na postojanju hiperkortizolemije. Ektopični Kušingov sindrom se javlja u uznapredovalom stadijumu bolesti i povezan je sa lošijim ishodom. U cilju lečenja i kontrole sindroma mogu se primeniti tirozin kinazni inhibitori kao i inhibitori steroidogeneze. Kompleksnost bolesti i potencijalna neželjena dejstva lekova iziskuju brižljivo praćene ovih pacijenata.

Literatura:

1. Wells SA, Jr., Asa SL, Dralle H, Elisei R, Evans DB, Gagel RF, et al. Revised American Thyroid Association guidelines for the management of medullary thyroid carcinoma. *Thyroid*. 2015;25(6):567-610.
2. Sahakian N, Castinetti F, Romanet P. Molecular Basis and Natural History of Medullary Thyroid Cancer: It is (Almost) All in the RET. *Cancers (Basel)*. 2023;15(19).
3. Kim GY, Park CY, Cho CH, Park JS, Jung ED, Jeon EJ. A Calcitonin-Negative Neuroendocrine Tumor Derived from Follicular Lesions of the Thyroid. *Endocrinol Metab (Seoul)*. 2015;30(2):221-5.
4. Pivovarova AI, Patrick S, Reddy PJ. Sporadic Medullary Thyroid Carcinoma with Paraneoplastic Cushing Syndrome. *Case Rep Endocrinol*. 2019;2019:6414921.
5. Choi HS, Kim MJ, Moon CH, Yoon JH, Ku HR, Kang GW, et al. Medullary thyroid carcinoma with ectopic adrenocorticotropic hormone syndrome. *Endocrinol Metab (Seoul)*. 2014;29(1):96-100.
6. Koehler VF, Fuss CT, Berr CM, Frank-Raue K, Raue F, Hoster E, et al. Medullary thyroid cancer with ectopic Cushing's syndrome: A multicentre case series. *Clin Endocrinol (Oxf)*. 2022;96(6):847-56.
7. Forde HE, Mehigan-Farrelly N, Ryan K, Moran T, Greally M, Duffy AG, et al. Metastatic medullary thyroid carcinoma presenting as ectopic Cushing's syndrome. *Endocrinol Diabetes Metab Case Rep*. 2021;2021.
8. Kim M, Kim BH. Current Guidelines for Management of Medullary Thyroid Carcinoma. *Endocrinol Metab (Seoul)*. 2021;36(3):514-24.
9. Dabelić N, Jukić T, Fröbe A. Medullary Thyroid Cancer - Feature Review and Update on Systemic Treatment. *Acta Clin Croat*. 2020;59(Suppl 1):50-9.
10. Maghsoomi Z, Emami Z, Malboosbaf R, Malek M, Khamseh ME. Efficacy and safety of peptide receptor radionuclide therapy in advanced radioiodine-refractory differentia-

- ted thyroid cancer and metastatic medullary thyroid cancer: a systematic review. *BMC Cancer.* 2021;21(1):579.
11. Trimboli P, Castellana M, Virili C, Giorgino F, Giovanella L. Efficacy of Vandetanib in Treating Locally Advanced or Metastatic Medullary Thyroid Carcinoma According to RECIST Criteria: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Front Endocrinol (Lausanne).* 2018;9:224.
 12. Schlumberger M, Elisei R, Müller S, Schöffski P, Brose M, Shah M, et al. Overall survival analysis of EXAM, a phase III trial of cabozantinib in patients with radiographically progressive medullary thyroid carcinoma. *Ann Oncol.* 2017;28(11):2813-9.
 13. Subbiah V, Velcheti V, Tuch BB, Ebata K, Busaidy NL, Cabanillas ME, et al. Selective RET kinase inhibition for patients with RET-altered cancers. *Ann Oncol.* 2018;29(8):1869-76.
 14. Subbiah V, Gainor JF, Rahal R, Brubaker JD, Kim JL, Maynard M, et al. Precision Targeted Therapy with BLU-667 for RET-Driven Cancers. *Cancer Discov.* 2018;8(7):836-49.